

B | BRAUNOPM
20/07/2004

Riferimenti di gara

Scheda Tecnica

NOME COMMERCIALE

BRAUNOL®

ILLUSTRAZIONE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Codice	Articolo	Unità minima	Quantità minima
18288	BRAUNOL7,5% SOL.CUT. BOTTIGLIA "I" 100ML	SCA	Da 20 PZ
2590158	BRAUNOL7,5% SOL.DET. BOTTIGLIA "I" 1000ML	SCA	Da 10 PZ
2590522	BRAUNOL 10% UNGUENTO TUBETTO "I" 20GR	SCA	Da 20 PZ
2590530	BRAUNOL 10% UNGUENTO TUBETTO "I" 100GR	SCA	Da 10 PZ
2591383	BRAUNOL7,5% SOL.CUT. BOTTIGL. "I" 1000ML	SCA	Da 10 PZ
2591901	BRAUNOL7,5% SOL.DET. BOTTIGLIA "I" 500ML	SCA	Da 20 PZ
18959	BRAUNOL BOTTIGLIA RONDO "I" 250ML	SCA	Da 20 PZ
18936	BRAUNOL7,5% SOL.CUT. BOTTIGLIA "I" 500ML	SCA	Da 20 PZ

	Officina di produzione certificata ISO 9001-EN 46001
CONFORMITA' ALLA F.U. ed XI	Il prodotto è conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto ottiene le autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio. In particolare, risponde ai requisiti previsti dalla F.U. ultima edizione e relativi aggiornamenti.

INDICAZIONE E/O DESTINAZIONE D'USO
AVVERTENZE E/O PRECAUZIONI
TOSSICOLOGIA**BRAUNOL****RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO****1. DENOMINAZIONE DELLA SPECIALITÀ'**

BRAUNOL

7,5% Soluzione Cutanea

7,5% Soluzione Cutanea con 2% di tensioattivo

7,5% Soluzione Cutanea con 6,8% di tensioattivo

10% Unguento

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

BRAUNOL 7,5 % Soluzione Cutanea

100 g di soluzione contengono:

Principio attivo

Povidone-Iodio 7,5 g
(con un contenuto di iodio libero del 10%)

BRAUNOL 10% Unguento

100 g di unguento contengono:

Principio attivo

Povidone-Iodio 10,0 g
(con un contenuto di iodio libero del 10%)

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea con 2% di tensioattivo

100 g di soluzione contengono:

Principio attivo

Povidone-Iodio 7,5 g
(con un contenuto di iodio libero del 10%)

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea con 6,8% di tensioattivo

100 g di soluzione contengono:

Principio attivo

Povidone-Iodio 7,5 g
(con un contenuto di iodio libero del 10%)

3. FORME FARMACEUTICHE

Soluzione cutanea; unguento.

4. INFORMAZIONI CLINICHE**4.1 Indicazioni terapeutiche***BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea*

Disinfezione della cute, anche lesa (ferite, piaghe, ecc.)
Antisepsi dell'area del campo operatorio

BRAUNOL 10% Unguento

Disinfezione di ferite, piaghe, ecc.
Trattamento antisettico di micosi.

*BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea con 2% di tensioattivo**BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea con 6,8% di tensioattivo*

Disinfezione e pulizia della cute lesa, nel caso di ferite.
Antisepsi anche chirurgica delle mani e della cute integra.

4.2 Posologia e modo di somministrazione*BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea*

Passare un tampone imbevuto sulla parte da disinfettare, fino a completa irrorazione.
Utilizzare diluito (da 1:2 fino a 1:100 v/v) secondo necessità.
Lesioni di dimensioni ridotte: non superare le 5-6 applicazioni/die.

Lesioni estese: il numero di applicazioni/die deve essere tale da non superare i 2,5-3 g/die di iodio libero (pari a circa 330-400 ml di prodotto puro).

Campo operatorio: utilizzare tal quale imbevendo un tampone e passare sulla parte da disinfettare. Lasciare asciugare. Se necessario ripetere l'operazione.

BRAUNOL 10% Unguento

Applicare direttamente sulla parte da trattare da 1 a 3 volte al giorno, secondo necessità.

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea con 2% di tensioattivo

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea con 6,8% di tensioattivo

Disinfezione e pulizia della cute lesa: per la disinfezione impiegare il prodotto puro mentre per la pulizia si consiglia di utilizzare diluito secondo necessità (fino a 1:4 v/v).

Applicare con un tampone imbevuto fino a completa irrorazione.

Lesioni di dimensioni ridotte: non superare le 5-6 applicazioni/die.

Lesioni estese: il numero di applicazioni/die deve essere tale da non superare i 2,5-3 g/die di iodio libero (pari a circa 330-400 ml di prodotto puro).

Antisepsi anche chirurgica delle mani e della cute integra.

Antisepsi

Inumidire leggermente con acqua le parti da trattare e frizionare in modo uniforme con 5 ml di sapone. Lasciar schiumare e risciacquare (durata 1 minuto).

Antisepsi chirurgica

Inumidire con acqua le parti da trattare, distribuire in modo uniforme 5 ml di sapone, lavare per due minuti (se del caso spazzolare le unghie) e risciacquare con acqua. Versare altri 5 ml di sapone, lavare per tre minuti, risciacquare ed asciugare con panno sterile (durata totale 5 minuti).

NON SUPERARE LE DOSI CONSIGLIATE

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità verso i componenti (principio attivo o eccipienti) e verso altre sostanze correlate dal punto di vista chimico.

A causa della presenza di iodio, il trattamento di lesioni estese per un periodo prolungato è controindicato in quanto non si può escludere la possibilità di una influenza sulla funzionalità tiroidea.

Il prodotto non deve essere utilizzato in soggetti con ipertiroidismo o con affezioni tiroidee latenti o manifeste.

Non usare nei bambini di età inferiore a 6 mesi, in gravidanza e durante l'allattamento.

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni d'uso

Il prodotto è solo per uso esterno. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare un medico per istituire una idonea terapia. In caso di intolleranza sospendere l'applicazione. Non usare per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico.

Non ingerire. L'ingestione o l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti può avere conseguenze gravi, talvolta fatali. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immediatamente un medico.

Evitare l'impiego su superfici eccessivamente estese. Non applicare la soluzione con bendaggio occlusivo. L'applicazione su ustioni o su vaste superfici di epitelio può produrre gli effetti

sistemici dello iodio, in questi casi si consiglia il controllo della funzionalità tiroidea. In bambini al di sotto dei 12 anni, usare solo in caso di effettiva necessità e sotto diretto controllo del medico. Il prodotto può interferire con le prove di funzionalità tiroidea: interrompere il trattamento almeno 10 giorni prima di effettuare una scintigrafia con iodio marcato.

Evitare il contatto con gli occhi o le mucose.

4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti. Non impiegare sulla parte trattata contemporaneamente prodotti contenenti sali di mercurio o composti di benzoino.

4.6 Gravidanza e allattamento

Poiché lo iodio viene assorbito per via sistemica l'uso di Povidone-Iodio è controindicato in gravidanza e durante l'allattamento specialmente quando l'area lesa da trattare è estesa o per trattamenti prolungati; infatti lo iodio assorbito può attraversare la barriera placentare ed essere escreto con il latte.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e di utilizzare macchinari

Il Povidone-Iodio non interferisce sulla capacità di guidare e di utilizzare macchine.

4.8 Effetti indesiderati

E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore, irritazione); in tal caso sospendere il trattamento. La reazione dello iodio con i tessuti lesi può ritardarne la cicatrizzazione. Il Povidone-Iodio può causare gli stessi effetti indesiderati dello iodio, anche se risulta essere meno irritante.

4.9 Sovradosaggio

Alle normali condizioni d'uso non sono state riportate manifestazioni di sovradosaggio.

L'applicazione su ustioni o estese superfici prive di epitelio può produrre gli effetti

sistemici dello iodio. In caso di ingestione accidentale ricorrere ad un'assistenza professionale.

In caso di ingestione del prodotto, trattare con latte o con soluzioni di amido; praticare aspirazione e lavanda gastrica con sospensioni o soluzioni di amido, con soluzioni di albume d'uovo o tiosolfato di sodio 1-5% (capace di trasformare lo iodio in ioduro). Si lascia poi nello stomaco ulteriore tiosolfato al 5% e si danno copiosi quantitativi di liquidi e mucillagini.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Il Povidone o Polivinilpirrolidone (PVP) è un polimero non surfattante ad attività iodofera, cioè capace di complessare lo iodio per rilasciarlo in seguito, gradualmente ed a basse concentrazioni, in forma libera.

Il complesso PVP-iodio esplica pertanto la sua attività antisettica ed antimicrobica proprio grazie alla sua capacità di liberare iodio.

Il Povidone (o Polivinilpirrolidone) contiene circa il 10% di iodio libero disponibile, il quale viene rilasciato gradualmente dal complesso in seguito a contatto con il substrato. L'antisepsi viene esplicata dallo iodio libero con un'azione ossidante diretta e persistente. Lo spettro d'azione è molto ampio e comprende: batteri Gram-positivi e Gram-negativi; batteri acido- e alcool-resistenti, miceti (Candida compresa), protozoi, virus e spore. La sua attività è mantenuta

in presenza di materiali organici. Non si conoscono fenomeni di resistenza.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Durante il trattamento topico con PVP-iodio è stato rilevato un modesto assorbimento sistemico con aumenti dei livelli sierici di iodio totale e di quello proteico, in ragione della dimensione della superficie (cute lesa o ustioni) trattata.

L'eliminazione renale, sia di iodio totale che di iodio legato alle proteine, risulta tuttavia molto elevata: non sono infatti rilevabili fenomeni di accumulo.

5.3 Proprietà tossicologiche

Il Povidone-Iodio presenta una tossicità minore rispetto allo iodio libero; dopo applicazione topica è praticamente privo di effetti sistemici e viene localmente ben tollerato.

Nel "patch test" e nel "repeated patch test" effettuati con le diverse presentazioni farmaceutiche della specialità BRAUNOL non sono state inoltre rilevate irritazioni cutanee primarie. Studi di tossicità acuta e subacuta effettuati sugli animali utilizzando le diverse presentazioni della specialità depongono altresì a favore della loro innocuità, nelle modalità e concentrazioni d'uso consigliate.

Prove di tossicità acuta:

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea

- nel ratto 30 ml/kg per os: tossicità assente.

BRAUNOL 10% Unguento

- nel topo e nel ratto fino a 10 g/kg topico con scarificazione della cute: tossicità assente.

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea con 6,8% di tensioattivo:

- nel topo DL50 per os pari a 30 ml/kg.

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea con 2% di tensioattivo:

- nel ratto 0,4 ml/kg i.p.: tossicità assente;

- nel topo 10 ml/kg topico con scarificazione della cute: tossicità assente.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Lista degli eccipienti

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea

Iodato di sodio, diidrogenofosfato di sodio diidrato, idrossido di sodio, nonossinolo, acqua depurata.

BRAUNOL 10% Unguento

Polietilenglicole 400, polietilenglicole 4000, sodio bicarbonato, acqua depurata.

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea con 2 % di tensioattivo:

Sodio bifosfato diidrato, sodio idrossido, sale di ammonio di alchilfenolpoliglicoletere solfato, acqua depurata.

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea con 6,8 % di tensioattivo:

Polivinilpirrolidone, sodio bifosfato diidrato, sodio idrossido, sodio lauril-etossisolfato, acqua depurata.

6.2 Incompatibilità

Sali di mercurio, carbonati, acido tannico, alcali, perossido di idrogeno.

6.3 Periodo di validità a confezionamento integro

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea:

flaconi da 30 ml, 100 ml, 250 ml e 500 ml: 3 anni

flaconi da 1000 ml: 5 anni.

BRAUNOL 10% Unguento: 3 anni

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea con 2% di tensioattivo: 3 anni

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea con 6,8% di tensioattivo: 18 mesi

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Tenere ben chiuso e lontano dalle fonti di calore

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea:

flaconi da 30 ml, 100 ml e 250 ml: non conservare al di sopra di 25°C

6.5 Natura e contenuto del contenitore

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea: flacone in polietilene con tappo a vite, contenente 30 ml, 100 ml o 1000 ml di soluzione.

BRAUNOL 10% Unguento: tubo in polietilene con tappo a vite, contenente 20 g o 100 g di unguento.

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea con 6,8 % di tensioattivo: flacone in polietilene con tappo a vite, contenente 1000 ml di soluzione;

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea con 2 % di tensioattivo: flacone in polietilene con tappo a vite, contenente 100 ml, 500 ml o 1000 ml di soluzione.

6.6 Istruzioni per l'uso

Nessuna particolare.

La colorazione bruna della soluzione è una proprietà del prodotto ed indica la presenza di iodio libero. Essendo il PVP-Iodio solubile in acqua, eventuali macchie su tessuti possono essere facilmente eliminate con acqua e sapone; nei casi più ostinati con ammoniaca o soluzione di tiosolfato di sodio.

7. TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA IMMISSIONE IN COMMERCIO

B. Braun Melsungen AG

D-34209 Melsungen, Germania

8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea

flacone da 30 ml: A.I.C. n° 032151084

flacone da 100 ml: A.I.C. n° 032151108

flacone da 1000 ml: A.I.C. n° 032151072

20 flaconi da 30 ml: A.I.C. n° 032151122

20 flaconi da 100 ml: A.I.C. n° 032151134

20 flaconi da 250 ml: A.I.C. n° 032151211

20 flaconi da 500 ml: A.I.C. n° 032151223

10 flaconi da 1000 ml: A.I.C. n° 032151146

BRAUNOL 10% Unguento

tubo da 20 g: A.I.C. n° 032151060
tubo da 100 g: A.I.C. n° 032151058
20 tubi da 20 g: A.I.C. n° 032151159
10 tubi da 100 g: A.I.C. n° 032151161

BRAUNOL 7,5% Soluzione cutanea con 6,8% di tensioattivo

flacone da 1000 ml: A.I.C. n° 032151045
10 flaconi da 1000 ml: A.I.C. n° 032151173

BRAUNOL 7,5% Soluzione cutanea con 2% di tensioattivo

flacone da 100 ml: A.I.C. n° 032151110
flacone da 500 ml: A.I.C. n° 032151021
flacone da 1000 ml: A.I.C. n° 032151019
20 flaconi da 100 ml: A.I.C. n° 032151185
20 flaconi da 500 ml: A.I.C. n° 032151197
10 flaconi da 1000 ml: A.I.C. n° 032151209

9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO

29.11.1995/29.11.2000

10. TABELLA DI APPARTENENZA DPR 309/90

Non compete

11. REGIME DI DISPENSAZIONE AL PUBBLICO

Medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, le seguenti confezioni:

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea

flacone da 30 ml: A.I.C. n° 032151084
flacone da 100 ml: A.I.C. n° 032151108
flacone da 1000 ml: A.I.C. n° 032151072

BRAUNOL 10% Unguento

tubo da 20 g: A.I.C. n° 032151060
tubo da 100 g: A.I.C. n° 032151058

BRAUNOL 7,5% Soluzione cutanea con 6,8% di tensioattivo

flacone da 1000 ml: A.I.C. n° 032151045

BRAUNOL 7,5% Soluzione cutanea con 2% di tensioattivo

flacone da 100 ml: A.I.C. n° 032151110
flacone da 500 ml: A.I.C. n° 032151021
flacone da 1000 ml: A.I.C. n° 032151019

Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura, le seguenti confezioni:

BRAUNOL 7,5% Soluzione Cutanea

20 flaconi da 30 ml: A.I.C. n° 032151122
20 flaconi da 100 ml: A.I.C. n° 032151134

10 flaconi da 1000 ml: A.I.C. n° 032151146
20 flaconi da 250 ml: A.I.C. n° 032151211
20 flaconi da 500 ml: A.I.C. n° 032151223

BRAUNOL 10% Unguento

20 tubi da 20 g: A.I.C. n° 032151159

10 tubi da 100 g: A.I.C. n° 032151161

BRAUNOL 7,5% Soluzione cutanea con 6,8% di tensioattivo

10 flaconi da 1000 ml: A.I.C. n° 032151173

BRAUNOL 7,5% Soluzione cutanea con 2% di tensioattivo

20 flaconi da 100 ml: A.I.C. n° 032151185

20 flaconi da 500 ml: A.I.C. n° 032151197

10 flaconi da 1000 ml: A.I.C. n° 032151209

12. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Maggio 2005

Casella di testo a disposizione per eventuali dichiarazioni ad hoc per la gara

ALLEGATI

ISO	X
SCHEDE DI SICUREZZA	X
FOGLIO ILLUSTRATIVO	X