

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

SmofKabiven senza elettroliti emulsione per infusione

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

SmofKabiven senza elettroliti consiste di una sacca divisa in tre compartimenti. Ogni compartimento contiene i seguenti volumi parziali a seconda delle quattro confezioni.

	986 ml	1477 ml	1970 ml	2463 ml	Per 1000 ml
Soluzione di aminoacidi	500 ml	750 ml	1000 ml	1250 ml	508 ml
Glucosio 42%	298 ml	446 ml	595 ml	744 ml	302 ml
Emulsione lipidica	188 ml	281 ml	375 ml	469 ml	190 ml

Questo corrisponde alle seguenti composizioni complessive:

Principi attivi	986 ml	1477 ml	1970 ml	2463 ml	Per 1000 ml
Alanina	7,0 g	10,5 g	14,0 g	17,5 g	7,1 g
Arginina	6,0 g	9,0 g	12,0 g	15,0 g	6,1 g
Glicina	5,5 g	8,2 g	11,0 g	13,8 g	5,6 g
Istidina	1,5 g	2,2 g	3,0 g	3,7 g	1,5 g
Isoleucina	2,5 g	3,8 g	5,0 g	6,2 g	2,5 g
Leucina	3,7 g	5,6 g	7,4 g	9,4 g	3,8 g
Lisina acetato					
corrispondente a lisina	3,3 g	5,0 g	6,6 g	8,4 g	3,4 g
Metionina	2,2 g	3,2 g	4,3 g	5,4 g	2,2 g
Fenilalanina	2,6 g	3,8 g	5,1 g	6,4 g	2,6 g
Prolina	5,6 g	8,4 g	11,2 g	14,0 g	5,7 g
Serina	3,2 g	4,9 g	6,5 g	8,1 g	3,3 g
Taurina	0,50 g	0,75 g	1,0 g	1,2 g	0,5 g
Treonina	2,2 g	3,3 g	4,4 g	5,4 g	2,2 g
Triptofano	1,0 g	1,5 g	2,0 g	2,5 g	1,0 g
Tirosina	0,20 g	0,30 g	0,40 g	0,49 g	0,20 g
Valina	3,1 g	4,6 g	6,2 g	7,6 g	3,1 g
Glucosio monoidrato					
corrispondente a					
glucosio anidro	125 g	187 g	250 g	313 g	127 g
Olio di semi di soia, raffinato	11,3 g	16,9 g	22,5 g	28,1 g	11,4 g
Trigliceridi a catena media	11,3 g	16,9 g	22,5 g	28,1 g	11,4 g
Olio di oliva raffinato	9,4 g	14,1 g	18,8 g	23,4 g	9,5 g
Olio di pesce, ricco in acidi omega-3	5,6 g	8,4 g	11,3 g	14,0 g	5,7 g

Corrispondente a

	986 ml	1477 ml	1970 ml	2463 ml	Per 1000 ml
• Aminoacidi	50 g	75 g	100 g	125 g	51 g
• Azoto	8 g	12 g	16 g	20 g	8 g
• Carboidrati					
- Glucosio anidro	125 g	187 g	250 g	313 g	127 g
• Lipidi	38 g	56 g	75 g	94 g	38 g
• Acetati ¹	73 mmol	110 mmol	147 mmol	183 mmol	74,5 mmol
• Fosfati ²	2,8 mmol	4,2 mmol	5,6 mmol	6,9 mmol	2,8 mmol
• Contenuto energetico					
- totale (appross.)	1100 kcal	1600 kcal	2200 kcal	2700 kcal	
	4,6 MJ	6,7 MJ	9,2 MJ	11,3 MJ	
- non proteico	900 kcal	1300 kcal	1800 kcal	2200 kcal	
(appross.)	3,8 MJ	5,4 MJ	7,5 MJ	9,2 MJ	
• Osmolalità	appross. 1600 mOsmol/kg				
• Osmolarità	appross. 1300 mOsmol/l				
• pH (dopo la miscelazione)	appross. 5,6				

⁽¹⁾ Contributo dato dalla soluzione aminoacidica

⁽²⁾ Contributo dato dall'emulsione lipidica

Per la lista di tutti gli eccipienti vedere sezione 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Emulsione per infusione.

Le soluzioni di glucosio e aminoacidi sono chiare e incolori leggermente tendenti al giallo e prive di particelle. L'emulsione lipidica è bianca ed omogenea.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Nutrizione parenterale per pazienti adulti quando la nutrizione orale o enterale è impossibile, insufficiente o controindicata.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

L'aspetto del prodotto dopo la miscelazione del contenuto dei 3 compartimenti è una emulsione bianca.

La capacità del paziente di eliminare il grasso e metabolizzare l'azoto e il glucosio, e il fabbisogno nutritivo devono disciplinare il dosaggio e la velocità di infusione, vedere la sezione 4.4.

La dose deve essere individualizzata per quanto riguarda le condizioni cliniche del paziente e il peso corporeo (pc).

Il fabbisogno di azoto per il mantenimento della massa proteica del corpo dipende dalla condizione del paziente (ad esempio, stato nutrizionale e grado di stress catabolico o anabolismo).

I requisiti sono 0,10-0,15 g di azoto/kg di peso corporeo/giorno (0,6-0,9 g di aminoacidi/kg di peso corporeo/giorno) nel normale stato nutrizionale o in condizioni di lieve stress catabolico. Nei pazienti con stress metabolico moderato-elevato, con o senza malnutrizione, il fabbisogno sarà compreso tra 0,15-0,25 g di azoto/kg di peso corporeo/giorno (0,9-1,6 g di aminoacidi/kg di peso corporeo/giorno). In alcune condizioni particolari (ad esempio ustioni o marcato anabolismo) il fabbisogno di azoto potrebbe essere addirittura superiore.

Dosaggio

Il dosaggio di 13 ml - 31 ml di SmofKabiven senza elettroliti/kg di peso corporeo/giorno corrisponde a 0,10 - 0,25 g di azoto/kg di peso corporeo/giorno (0,6 - 1,6 g di aminoacidi/kg di peso corporeo/giorno) e di 14 - 35 kcal/kg di peso corporeo/giorno del consumo totale di energia (12 - 27 kcal/kg di peso corporeo/giorno di energia non proteica). Questo riguarda il fabbisogno della maggior parte dei pazienti. Nei pazienti obesi la dose deve essere basata sulla stima del peso ideale.

Velocità d'infusione

La massima velocità di infusione di glucosio è di 0,25 g/kg di peso corporeo/h, per gli aminoacidi 0,1 g/kg di peso corporeo/h, e per i grassi 0,15 g/kg di peso corporeo/h.

La velocità di infusione non deve superare 2,0 ml/kg di peso corporeo/h (corrispondente a 0,25 g di glucosio, 0,10 g di aminoacidi, e 0,08 g di grassi/kg di peso corporeo/h). Il periodo di infusione raccomandato è 14 - 24 ore.



Massima dose giornaliera

La massima dose giornaliera varia con le condizioni cliniche del paziente e può anche cambiare da un giorno all'altro. La dose giornaliera massima raccomandata è di 35 ml/kg di peso corporeo/giorno.

La massima dose giornaliera raccomandata di 35 ml/kg di peso corporeo/giorno fornirà azoto 0,28 g/kg di peso corporeo/giorno (corrispondenti a 1,8 g di aminoacidi/kg di peso corporeo/giorno), 4,5 g di glucosio/kg di peso corporeo/giorno, 1,33 g di grassi/kg di peso corporeo/giorno e un totale di energia di 39 kcal/kg di peso corporeo/giorno (corrispondenti a 31 kcal/kg di peso corporeo/giorno di energia non proteica).

Modalità e durata di somministrazione

Uso endovenoso, per infusione in una vena centrale.

I quattro diversi confezionamenti di SmofKabiven senza elettroliti sono destinati a pazienti con fabbisogno nutrizionale elevato, basale o moderatamente aumentato. Per fornire la nutrizione parenterale totale dovrebbero essere aggiunti a SmofKabiven senza elettroliti secondo le necessità dei pazienti, oligoelementi, elettroliti e vitamine.

Pazienti pediatrici

L'uso di SmofKabiven senza elettroliti nei bambini non è raccomandato, vedere la sezione 4.4.

4.3 Controindicazioni

- Ipersensibilità alle proteine del pesce, di uova, di soia o delle arachidi o ad uno qualsiasi degli eccipienti o sostanze attive.
- Grave iperlipidemia
- Grave insufficienza epatica
- Gravi disturbi della coagulazione del sangue
- Difetti congeniti del metabolismo degli aminoacidi
- Grave insufficienza renale, senza accesso ad emofiltrazione o dialisi
- Shock acuto
- Iperglicemia incontrollata
- Controindicazioni generali per terapia infusionale: edema polmonare acuto, iperidratazione, ed insufficienza cardiaca scompensata
- Sindrome emofagocitica
- Condizioni instabili (ad esempio gravi condizioni post-traumatiche, diabete mellito non compensato, infarto acuto del miocardio, ictus, embolia, acidosi metabolica, grave sepsi, disidratazione ipotonica e coma iperosmolare)

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso

La capacità di eliminare i grassi è individuale e deve pertanto essere monitorata secondo la prassi medica. Questo controllo è, in generale, monitorato dai livelli dei trigliceridi. La concentrazione di trigliceridi nel siero non deve superare le 4 mmol/l durante l'infusione. Un sovradosaggio può portare ad una sindrome da sovraccarico di grassi, vedere la sezione 4.8.

SmofKabiven senza elettroliti deve essere somministrato con cautela in condizioni di alterato metabolismo lipidico, che pos-

sono verificarsi in pazienti con insufficienza renale, diabete mellito, pancreatite, alterata funzionalità epatica, ipotiroidismo e sepsi.

Questo medicinale contiene olio di semi di soia, olio di pesce e fosfolipidi derivati da uova, che possono raramente causare reazioni allergiche. Una reazione allergica crociata è stata osservata tra soia e arachidi.

Per evitare rischi connessi con una velocità di infusione troppo rapida, si raccomanda un'infusione continua e ben controllata, se possibile, utilizzando una pompa volumetrica.

Dal momento che un aumento del rischio di infezione è associato con l'uso di una qualsiasi vena centrale, dovrebbero essere prese precauzioni per una rigorosa asepsi allo scopo di evitare qualsiasi contaminazione durante la manipolazione e l'inserimento del catetere.

Devono essere controllati i livelli sierici di glucosio, elettroliti e l'osmolarità così come l'equilibrio dei fluidi, lo stato acido-base e gli enzimi epatici.

La crasi ematica e la coagulazione devono essere monitorati quando l'infusione di grassi è assunta per un periodo più lungo.

SmofKabiven senza elettroliti è prodotto quasi senza elettroliti per i pazienti con una richiesta speciale e/o limitata di elettroliti. Sodio, potassio, calcio, magnesio e quantità aggiunte di fosfato devono essere aggiunti in base alle condizioni cliniche del paziente e monitorando frequentemente i livelli del siero.

In pazienti con insufficienza renale, la somministrazione di fosfato deve essere monitorata attentamente per prevenire l'iperfosfatemia.

La quantità dei singoli elettroliti deve essere aggiunta in base alle condizioni cliniche del paziente e monitorando frequentemente i livelli del siero.

La nutrizione parenterale deve essere somministrata con cautela in caso di acidosi lattica, insufficiente ossigenazione cellulare e un aumento dell'osmolarità del siero.

Ogni segno o sintomo di reazione anafilattica (come febbre, brividi, rash o dispnea) deve comportare l'immediata interruzione dell'infusione.

Il contenuto in grassi di SmofKabiven senza elettroliti può interferire con taluni test di laboratorio (ad esempio bilirubina, lattato deidrogenasi, saturazione di ossigeno, emoglobina) se il campione di sangue è stato prelevato prima che i grassi somministrati siano stati eliminati in maniera adeguata dal flusso sanguigno. I grassi non si ritrovano nel flusso ematico dopo un intervallo di 5 - 6 ore senza infusione di grassi, nella maggior parte dei pazienti.

L'infusione endovenosa di aminoacidi è accompagnata da un



aumento dell'escrezione urinaria di oligoelementi, in particolare di rame e zinco. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nella somministrazione di oligoelementi, in particolare durante i trattamenti nutrizionali endovenosi a lungo termine.

In pazienti malnutriti, l'inizio della nutrizione parenterale può dar luogo ad un cambio della fluidità ematica con conseguente edema polmonare ed insufficienza cardiaca congestizia, nonché una diminuzione della concentrazione sierica di potassio, fosforo, magnesio e vitamine idrosolubili. Questi cambiamenti possono verificarsi entro 24 - 48 ore, quindi si raccomanda molta attenzione e un avvio lento della nutrizione parenterale in questo gruppo di pazienti, con un attento monitoraggio ed opportuni adattamenti dei fluidi, elettroliti, minerali e vitamine.

SmofKabiven senza elettroliti non deve essere somministrato contemporaneamente al sangue nello stesso set di infusione a causa del rischio di pseudoagglutinazione.

Nei pazienti con iperglicemia, potrebbe essere necessaria la somministrazione esogena di insulina.

A causa della composizione della soluzione di aminoacidi in SmofKabiven senza elettroliti, il prodotto non è adatto per l'uso in neonati o nei bambini al di sotto dei 2 anni di età. Attualmente non vi è esperienza clinica dell'uso di SmofKabiven senza elettroliti nei bambini (da 2 a 11 anni di età).

Al momento non vi è alcuna esperienza clinica nel trattamento con la componente lipidica di SmofKabiven senza elettroliti per più di 14 giorni.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

Alcuni medicinali, come l'insulina, possono interferire con il sistema della lipasi corporea. Questo tipo di interazione sembra, tuttavia, essere di rilevanza clinica limitata.

L'eparina in dosi cliniche provoca un transitorio rilascio di lipoproteine lipasi in circolo. Questo può comportare inizialmente un aumento della lipolisi plasmatica seguita da una diminuzione transitoria di clearance dei trigliceridi.

L'olio di semi di soia ha un contenuto naturale di vitamina K1. Tuttavia, la concentrazione in SmofKabiven senza elettroliti è così bassa che non si prevede che possa influenzare in maniera significativa il processo di coagulazione nei pazienti trattati con derivati della cumarina.

4.6 Gravidanza e allattamento

Non sono disponibili dati riguardanti l'esposizione di SmofKabiven senza elettroliti in gravidanza o durante l'allattamento. Non ci sono studi disponibili sulla tossicità riproduttiva negli animali.

La nutrizione parenterale può diventare necessaria durante la gravidanza e l'allattamento. SmofKabiven senza elettroliti deve essere somministrato a donne in gravidanza e durante l'allattamento soltanto dopo un attento esame.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari

Non pertinente.

4.8 Effetti indesiderati

	Comune > 1/100, < 1/10	Non comune > 1/1000, < 1/100	Raro > 1/10000, < 1/1000
<i>Patologie cardiache</i>			Tachicardia
<i>Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche</i>			Dispnea
<i>Patologie gastrointestinali</i>		Mancanza d'appetito, nausea, vomito	
<i>Disturbi del metabolismo e della nutrizione</i>		Elevati livelli plasmatici di enzimi epatici	
<i>Patologie vascolari</i>			Ipotensione, ipertensione
<i>Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione</i>	Lieve aumento della temperatura corporea	Brividi, capogiri, mal di testa	Reazioni di ipersensibilità (es. reazioni anafilattiche o anafilattoidi, rush cutaneo, orticaria, vampate di calore, cefalea), sensazione di caldo o freddo, pallore, cianosi, dolore al collo, schiena, ossa, torace e dolore a livello lombare.

Se questi effetti si verificano l'infusione di SmofKabiven senza elettroliti dovrebbe essere interrotta o, se necessario, proseguita con una riduzione del dosaggio.

Sindrome da sovraccarico di grassi

Una ridotta capacità di eliminare i trigliceridi può portare alla "sindrome da sovraccarico di grassi", che può essere causata da sovradosaggio. Possibili segni di sovraccarico metabolico devono essere considerati. La causa può essere genetica (diverso metabolismo individuale) o il metabolismo dei grassi può essere alterato da malattie in corso o pregresse. Questa sindrome può anche apparire durante una grave ipertrigliceridemia, anche alla velocità di infusione raccomandata, e in associazione con un improvviso cambiamento della condizione clinica del paziente, come il deterioramento della funzione renale o un'infezione. La sindrome da sovraccarico di grassi è caratterizzata da iperlipemia, febbre, infiltrazione grassa, epatomegalia, con o senza ittero, splenomegalia, anemia, leucopenia, trombocitopenia, disturbi della coagulazione, emolisi e reticulocitosi, test di funzionalità epatica e coma. I sintomi sono generalmente reversibili se l'infusione dell'emulsione lipidica è interrotta.

Eccesso di infusione di aminoacidi

Come con altre soluzioni di aminoacidi, il contenuto di aminoacidi in SmofKabiven senza elettroliti può causare effetti indesiderati quando la velocità di infusione raccomandata è superata. Questi effetti sono nausea, vomito, brividi e sudorazione. L'infusione di aminoacidi può anche causare un aumento della

temperatura corporea. Aumento dei livelli di metaboliti contenenti azoto (ad esempio, della creatinina, urea) può manifestarsi con una ridotta funzione renale.

Eccesso di infusione di glucosio

Se la capacità del paziente di metabolizzare il glucosio viene superata, si svilupperà iperglicemia.

4.9 Sovradosaggio

Vedere paragrafo 4.8 “Sindrome da sovraccarico di grassi”, “Eccesso di infusione di aminoacidi” e “Eccesso di infusione di glucosio”.

Se si verificano i sintomi da sovradosaggio di grassi o aminoacidi, l'infusione deve essere rallentata o interrotta. Non vi è alcun antidoto specifico per il sovradosaggio. Le procedure di emergenza dovrebbero essere misure di sostegno generali, con particolare attenzione ai sistemi respiratorio e cardiovascolare. Uno stretto monitoraggio biochimico potrebbe essere essenziale e specifiche anomalie cliniche dovrebbero essere trattate adeguatamente.

Se si verifica iperglicemia, questa deve essere trattata in relazione alla situazione clinica attraverso opportuna somministrazione di insulina e/o adeguamento della velocità di infusione.

Inoltre, il sovradosaggio potrebbe causare un sovraccarico di liquidi, squilibri elettrolitici e iperosmolalità.

In alcuni rari casi più gravi possono essere considerati l'emo-dialisi, l'emofiltrazione o l'emo-diafiltrazione.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Gruppo farmacoterapeutico: Soluzioni per nutrizione parenterale
ATC: B05BA10

Emulsione lipidica

L'emulsione di lipidi di SmofKabiven senza elettroliti è composta di Smoflipid e ha una dimensione delle particelle e proprietà biologiche simili a quelle dei chilomicroni endogeni. I componenti di Smoflipid, olio di semi di soia, trigliceridi a catena media, olio d'oliva e olio di pesce hanno, fatta eccezione per il loro contenuto energetico, proprietà farmacodinamiche specifiche.

L'olio di soia ha un alto contenuto di acidi grassi essenziali. L'acido grasso linoleico omega-6 è il più abbondante (circa 55-60%). L'acido alfa-linolenico, un acido grasso omega-3, costituisce circa l'8%. Questa parte del prodotto fornisce la necessaria quantità di acidi grassi essenziali.

Gli acidi grassi a catena media sono rapidamente ossidati e forniscono al corpo una forma di energia immediatamente disponibile.

L'olio d'oliva principalmente fornisce energia sotto forma di acidi grassi mono-insaturi, che sono molto meno inclini a perossidazione rispetto ai corrispondenti acidi grassi poli-insaturi.

L'olio di pesce è caratterizzato da un alto contenuto di acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA). Il DHA è un importante componente strutturale delle membrane cellulari, mentre l'EPA è un precursore degli eicosanoidi come prostaglandine, tromboxani e leucotrieni.

Aminoacidi

Gli aminoacidi, costituenti delle proteine normalmente presenti nel cibo, sono utilizzati per la sintesi delle proteine da parte dei tessuti e l'eventuale eccedenza viene convogliata ad una serie di vie metaboliche. Gli studi hanno mostrato un effetto termogenico da parte dell'infusione di aminoacidi.

Glucosio

Il glucosio non dovrebbe avere effetti farmacodinamici oltre a contribuire a mantenere o ricostituire il normale stato nutrizionale.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Emulsione lipidica

I singoli trigliceridi in Smoflipid hanno diverse velocità di eliminazione, ma come miscela, Smoflipid è eliminato più rapidamente rispetto ai trigliceridi a catena lunga (LCT). L'olio d'oliva ha una velocità più lenta di eliminazione dei vari componenti (un po' più lenta di quella degli LCT) mentre i trigliceridi a catena media (MCT) mostrano una eliminazione più veloce. L'olio di pesce, in una miscela con LCT, ha la stessa velocità di eliminazione degli LCT da soli.

Aminoacidi

Le principali proprietà farmacocinetiche della infusione amminoacida sono essenzialmente le stesse che per gli aminoacidi forniti normalmente dal cibo. Tuttavia gli aminoacidi delle proteine contenute nella dieta entrano prima nella vena porta e quindi nella circolazione sistemica, mentre l'infusione amminoacidica endovenosa raggiunge la circolazione sistemica direttamente.

Glucosio

Le proprietà farmacocinetiche del glucosio infuso sono essenzialmente le stesse di quelle del glucosio fornito con il cibo ordinariamente.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Non sono stati effettuati studi preclinici relativi alla sicurezza con SmofKabiven senza elettroliti. Tuttavia, i dati preclinici di Smoflipid nonché degli aminoacidi e delle soluzioni di glucosio a diverse concentrazioni, rivelano assenza di rischi per gli esseri umani sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute e genotossicità. Nessun effetto teratogeno od altre lesioni embriotossiche si sono osservati nei conigli trattati con soluzioni di aminoacidi e non si attendono risultati diversi da emulsioni di grassi quando assunti alla dose



raccomandata come terapia sostitutiva. Prodotti alimentari (aminoacidi soluzioni, emulsioni di grassi) utilizzati nella terapia di sostituzione a livello fisiologico non dovrebbero essere embriotossici, teratogeni, o influenzare le prestazioni riproduttive o la fertilità.

In un test su cavie (test di massimizzazione) l'emulsione di olio di pesce ha dimostrato di dare sensibilizzazione cutanea moderata. Un test sistemico di antigenicità non ha dato alcuna indicazione di potenziali reazioni di tipo anafilattico da parte dell'olio di pesce.

In uno studio di tollerabilità locale su conigli con Smoflipid è stata osservata una lieve, transitoria infiammazione dopo somministrazione intra-arteriosa, paravenosa o sottocutanea. Dopo somministrazione intramuscolare sono state osservate, in alcuni animali, una moderata infiammazione transitoria e necrosi dei tessuti.

6. Informazioni farmaceutiche

6.1 Elenco degli eccipienti

Glicerolo
Fosfolipidi purificati di uovo
all-rac- α -tocoferolo
Idrossido di sodio (regolatore del pH)
Oleato di sodio
Acido acetico glaciale (regolatore del pH)
Acido cloridrico (regolatore del pH)
Acqua per preparazioni iniettabili

6.2 Incompatibilità

SmofKabiven senza elettroliti può essere miscelato con altri medicinali per i quali è stata documentata la compatibilità.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita 2 anni

Validità dopo la miscelazione

La stabilità chimico-fisica della miscelazione dei tre compartimenti è stata dimostrata per 36 ore a 25°C. Da un punto di vista microbiologico il prodotto deve essere utilizzato immediatamente. Se il prodotto miscelato non è usato immediatamente, i tempi di stoccaggio e le condizioni prima dell'uso sono responsabilità dell'utilizzatore e normalmente non possono essere più di 24 ore a 2-8 °C.

Validità dopo la miscelazione con additivi

Da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente dopo aver aggiunto gli additivi. Se non utilizzato immediatamente, l'uso nel periodo di stoccaggio e le condizioni prima dell'uso sono sotto la responsabilità dell'utilizzatore e normalmente non dovrebbe essere somministrato dopo 24 ore dalla preparazione e conservato a 2-8°C.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non congelare. Conservare nella sovrasacca.

Validità dopo la miscelazione: Vedere la sezione 6.3.

Validità dopo la miscelazione con additivi: Vedere la sezione 6.3.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Il contenitore è costituito da una sacca interna multicompartimentata e da una sovrasacca. La sacca interna è suddivisa in tre compartimenti da setti apribili. Un assorbitore per l'ossigeno è collocato tra la sacca interna e la sovrasacca. La sacca interna è costituita da un film polimerico multistrato, in alternativa, Excel o Biofine. Il film di Excel interno si compone di tre strati. Lo strato interno è costituito da poli copolimero (propilene/etilene) e da un elastomero termoplastico (SEBS) a base di stirene/etilene/butilene/stirene. Lo strato intermedio è costituito da SEBS e lo strato esterno è costituito da un copoliestere-etere. La porta per l'infusione è protetta da un tappo di Poliolefine. La porta di addizione è dotata di un tappo sintetico di poliisoprene (latex-free).

Il comparto interno di film Biofine è costituito da poli (propilene-co-etilene), di uno strato di gomma sintetica poli [stirene-blocco-(butilene-co-etilene)] (SEBS) e di uno strato di gomma sintetica poli (stirene-blocco-isoprene) (SIS). Le porte di infusione e addizione sono costituite da polipropilene e gomma sintetica poli [stirene-blocco-(butilene-co-etilene)] (SEBS) dotato di tappi di poliisoprene sintetico (latex-free). La porta cieca, che viene utilizzata solo durante la produzione, è fatta di polipropilene, dotato di un tappo sintetico di poliisoprene (latex-free).

Confezioni:

1 x 986 ml, 4 x 986 ml
1 x 1477 ml, 4 x 1477 ml
1 x 1970 ml, 2 x 1970 ml (Excel), 4 x 1970 ml (Biofine)
1 x 2463 ml, 2 x 2463 ml (Excel), 3 x 2463 ml (Biofine)

Non tutte le confezioni possono essere commercializzate.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento

Istruzioni per l'uso

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato. Usare solo se le soluzioni di aminoacidi e glucosio sono chiare e incolori o leggermente gialle e se l'emulsione lipidica è bianca e omogenea. Il contenuto delle tre sezioni separate deve essere mescolato prima dell'uso, e prima di aggiungere qualsiasi additivo attraverso la porta di addizione.

Dopo la separazione dei setti apribili la sacca deve essere capovolta più volte per assicurarsi una miscelazione ottimale in modo da non osservare nessuna separazione di fase.

Compatibilità

Solo soluzioni medicinali o nutrizionali per le quali esiste una documentata compatibilità possono essere aggiunte a SmofKabiven senza elettroliti. Compatibilità per differenti ad-

ditivi e tempi di conservazione di miscele diverse da quanto indicato saranno fornite su richiesta.

Le aggiunte devono essere effettuate in condizioni di asepsi.

Per un solo utilizzo. La soluzione non utilizzata deve essere smaltita in conformità ai requisiti di legge locali.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Fresenius Kabi Italia S.r.l.
Via Camagre, 41
37063 Isola della Scala – Verona

8. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

040716173/M - 1 Sacca Excel Multicompartimentata	da 986 ml
040716185/M - 4 Sacche Excel Multicompartimentate	da 986 ml
040716197/M - 1 Sacca Biofine Multicompartimentata	da 986 ml
040716209/M - 4 Sacche Biofine Multicompartimentate	da 986 ml
040716211/M - 1 Sacca Excel Multicompartimentata	da 1477 ml
040716223/M - 4 Sacche Excel Multicompartimentate	da 1477 ml
040716235/M - 1 Sacca Biofine Multicompartimentata	da 1477 ml
040716247/M - 4 Sacche Biofine Multicompartimentate	da 1477 ml
040716250/M - 1 Sacca Excel Multicompartimentata	da 1970 ml
040716262/M - 1 Sacca Biofine Multicompartimentata	da 1970 ml
040716274/M - 2 Sacche Excel Multicompartimentate	da 1970 ml
040716286/M - 4 Sacche Biofine Multicompartimentate	da 1970 ml
040716298/M - 1 Sacca Excel Multicompartimentata	da 2463 ml
040716300/M - 1 Sacca Biofine Multicompartimentata	da 2463 ml
040716312/M - 2 Sacche Excel Multicompartimentate	da 2463 ml
040716324/M - 3 Sacche Biofine Multicompartimentate	da 2463 ml

9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE O DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Luglio 2011

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

--/----



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Italia S.r.l.
Via Camagre, 41
37063 Isola della Scala (VR)
Tel. 045 6649321 - Fax 045 6649444
e-mail: marketing-it@fresenius-kabi.com